


EN MATERNITÉ


Porcelets non sevrés (sevrage à 28 jours)

En cas d'ingestion insuffisante de lait par les porcelets, les mesures à prendre sont spécifiées dans un encadré de fond gris




EN POST-SEVRAGE

Durée : 6 à 8 semaines



EN ENGRAISSEMENT

Durée : 12 à 16 semaines



Mesures préventives


Mesures correctives

→ Cycle de production

Aspects du bien-être des porcs améliorés

-  Réduit les risques de troubles digestifs, respiratoires et locomoteurs
-  Réduit la sensibilité au stress thermique
-  Limite la sensation de faim ou de soif
-  Limite le stress social
-  Facilite les déplacements
-  Favorise les comportements naturels de l'espèce (exploration, foinage, nidification, etc.)
-  Favorise le repos
-  Réduit le risque de caudophagie
-  Réduit le risque de lésions corporelles (hors caudophagie)
-  Réduit le stress lié à l'isolement
-  Limite les conséquences des mutilations sur le bien-être

HÉBERGEMENT DES VERRATS




Sélection des verrats souffleurs



Caractéristiques

- Critères de sélection génétique : pas de lignées à croissance rapide

Sélection des cochettes



Caractéristiques

- Poids : 135-150 kg
- Âge à la reproduction : environ 200 jours
- Critères de sélection génétique : pas de lignées à croissance rapide ou hyper-prolifiques

Pour plus d'informations

Consulter l'infographie sur le bien-être des femelles reproductrices



RETOUR

LÉGENDE

 Mesures préventives

 Mesures correctives

 Cycle de production

Aspects du bien-être des porcs améliorés

-  Réduit les risques de troubles digestifs, respiratoires et locomoteurs
-  Réduit la sensibilité au stress thermique
-  Limite la sensation de faim ou de soif
-  Limite le stress social
-  Facilite les déplacements
-  Favorise les comportements naturels de l'espèce (exploration, fouissage, nidification, etc.)
-  Favorise le repos
-  Réduit le risque de caudophagie
-  Réduit le risque de lésions corporelles (hors caudophagie)
-  Réduit le stress lié à l'isolement
-  Limite les conséquences des mutilations sur le bien-être



RETOUR

EN MATERNITÉ

Porcelets non sevrés (sevrage à 28 jours)

En cas d'ingestion insuffisante de lait par les porcelets,
les mesures à prendre sont spécifiées dans un encadré de fond gris


LÉGENDE

Mesures préventives

Mesures correctives

Aspects du bien-être des porcs améliorés

- Réduit les risques de troubles digestifs, respiratoires et locomoteurs
- Réduit la sensibilité au stress thermique
- Limite la sensation de faim ou de soif
- Limite le stress social
- Facilite les déplacements
- Favorise les comportements naturels de l'espèce (exploration, fouissage, nidification, etc.)
- Favorise le repos
- Réduit le risque de caudophagie
- Réduit le risque de lésions corporelles (hors caudophagie)
- Réduit le stress lié à l'isolement
- Limite les conséquences des mutilations sur le bien-être





RETOUR

EN POST-SEVRAGE

Durée : 6 à 8 semaines


LÉGENDE

Mesures préventives

Mesures correctives

Aspects du bien-être des porcs améliorés

- ➕ Réduit les risques de troubles digestifs, respiratoires et locomoteurs
- 🌡️ Réduit la sensibilité au stress thermique
- 🍽️ Limite la sensation de faim ou de soif
- ⚡ Limite le stress social
- 🚶 Facilite les déplacements
- 🐷 Favorise les comportements naturels de l'espèce (exploration, fouissage, nidification, etc.)
- 🌙 Favorise le repos
- 🐷 Réduit le risque de caudophagie
- 🩹 Réduit le risque de lésions corporelles (hors caudophagie)
- 📺 Réduit le stress lié à l'isolement
- ✂️ Limite les conséquences des mutilations sur le bien-être





RETOUR

EN ENGRAISSEMENT

Durée : 12 à 16 semaines


LÉGENDE

Mesures préventives

Mesures correctives

Aspects du bien-être des porcs améliorés

- ➕ Réduit les risques de troubles digestifs, respiratoires et locomoteurs
- 🌡️ Réduit la sensibilité au stress thermique
- 👄 Limite la sensation de faim ou de soif
- ⚡ Limite le stress social
- 🚶 Facilité les déplacements
- 🐷 Favorise les comportements naturels de l'espèce (exploration, fouissage, nidification, etc.)
- 🌙 Favorise le repos
- 🐷 Réduit le risque de caudophagie
- 🩸 Réduit le risque de lésions corporelles (hors caudophagie)
- 🛡️ Réduit le stress lié à l'isolement
- ✂️ Limite les conséquences des mutilations sur le bien-être






RETOUR



Sélection des cochettes



Caractéristiques


- Poids : 135-150 kg
- Âge à la reproduction : environ 200 jours
- Critères de sélection génétique :
pas de lignées à croissance rapide ou
hyper-prolifiques



RETOUR



Sélection des verrats souffleurs



Caractéristiques

- Critères de sélection génétique :
pas de lignées à croissance rapide



RETOUR

HÉBERGEMENT DES VERRATS

LÉGENDE

Mesures préventives

Mesures correctives

Aspects du bien-être des porcs améliorés

- + Réduit les risques de troubles digestifs, respiratoires et locomoteurs
- 🌡️ Réduit la sensibilité au stress thermique
- 🍖 Limite la sensation de faim ou de soif
- ⚡ Limite le stress social
- 🚶 Facilite les déplacements
- 🐷 Favorise les comportements naturels de l'espèce (exploration, fouissage, nidification, etc.)
- 🌙 Favorise le repos
- 👁️ Réduit le risque de caudophagie
- 🩹 Réduit le risque de lésions corporelles (hors caudophagie)
- 📺 Réduit le stress lié à l'isolement
- ✂️ Limite les conséquences des mutilations sur le bien-être

