

MATERNITÉ





RETOUR

LÉGENDE

Mesures préventives

Mesures correctives

→ Cycle de production

→ Transfert vers ou depuis l'infirmerie

Aspects du bien-être des cochettes et des truies améliorés



Améliore l'état de santé (réduction du risque de lésions corporelles et/ou de troubles locomoteurs)



Réduit la sensibilité au stress thermique



Limite la sensation de faim ou de soif



Limite le stress social



Facilite les déplacements



Favorise les comportements naturels de l'espèce (exploration, fouissage, nidification, etc.)



Favorise le repos



Évite le stress lié à la manipulation



RETOUR

LÉGENDE

Mesures préventives


Mesures correctives

Aspects du bien-être des cochettes et des truies améliorés

-  Améliore l'état de santé (réduction du risque de lésions corporelles et/ou de troubles locomoteurs)
-  Réduit la sensibilité au stress thermique
-  Limite la sensation de faim ou de soif
-  Limite le stress social
-  Facilite les déplacements
-  Favorise les comportements naturels de l'espèce (exploration, fouissage, nidification, etc.)
-  Favorise le repos
-  Évite le stress lié à la manipulation



Sélection des cochettes



Caractéristiques

- Poids : 135-150 kg
- Âge à la reproduction : environ 200 jours
- Critères de sélection génétique : pas de lignées à croissance rapide ou hyper-prolifiques



RETOUR

Enclos de regroupement

Situation favorable

Durée variable :
minimum 1 semaine


LÉGENDE

Mesures préventives

Mesures correctives

Aspects du bien-être des cochettes et des truies améliorés

-  Améliore l'état de santé (réduction du risque de lésions corporelles et/ou de troubles locomoteurs)
-  Réduit la sensibilité au stress thermique
-  Limite la sensation de faim ou de soif
-  Limite le stress social
-  Facilite les déplacements
-  Favorise les comportements naturels de l'espèce (exploration, fouissage, nidification, etc.)
-  Favorise le repos
-  Évite le stress lié à la manipulation





RETOUR

Enclos de regroupement

Situation convenable

Jusqu'à 1 semaine avant la mise-bas

Éléments distinctifs de la situation favorable


LÉGENDE

Mesures préventives

Mesures correctives

Aspects du bien-être des cochettes et des truies améliorés

-  Améliore l'état de santé (réduction du risque de lésions corporelles et/ou de troubles locomoteurs)
-  Réduit la sensibilité au stress thermique
-  Limite la sensation de faim ou de soif
-  Limite le stress social
-  Facilite les déplacements
-  Favorise les comportements naturels de l'espèce (exploration, fouissage, nidification, etc.)
-  Favorise le repos
-  Évite le stress lié à la manipulation





RETOUR

Enclos de maternité

Truie seule pendant environ 5 jours


LÉGENDE

Mesures préventives

Mesures correctives

Aspects du bien-être des cochettes et des truies améliorés

-  Améliore l'état de santé (réduction du risque de lésions corporelles et/ou de troubles locomoteurs)
-  Réduit la sensibilité au stress thermique
-  Limite la sensation de faim ou de soif
-  Limite le stress social
-  Facilite les déplacements
-  Favorise les comportements naturels de l'espèce (exploration, fouissage, nidification, etc.)
-  Favorise le repos
-  Évite le stress lié à la manipulation





RETOUR

Enclos de maternité

Truie avec ses porcelets
pendant environ 4 semaines


LÉGENDE

Mesures préventives

Mesures correctives

Aspects du bien-être des cochettes et des truies améliorés

-  Améliore l'état de santé (réduction du risque de lésions corporelles et/ou de troubles locomoteurs)
-  Réduit la sensibilité au stress thermique
-  Limite la sensation de faim ou de soif
-  Limite le stress social
-  Facilite les déplacements
-  Favorise les comportements naturels de l'espèce (exploration, fouissage, nidification, etc.)
-  Favorise le repos
-  Évite le stress lié à la manipulation



Surveillance pré-, per-, et post-partum de la truie

Espace suffisant ($\geq 8 \text{ m}^2$) pour permettre à la truie :

- de choisir une aire adaptée à ses besoins thermiques
- d'établir des aires fonctionnelles séparées (repos, alimentation, excrétion)
- d'initier des contacts avec ses porcelets
- et de se soustraire aux sollicitations des porcelets lorsqu'elle le souhaite



RETOUR

Contrôle de l'état de la truie après sevrage



Critères d'inspection :

- État des mamelles
- État corporel
- Locomotion



RETOUR

Case d'infirmierie

